

**SEMAFORIZACIÓN PARA LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA**

		<b>ROJO</b>	<b>NARANJA</b>	<b>AMARILLO</b>	<b>VERDE</b>
<p align="center"><b>Medidas de Salud Pública.</b></p> <p align="center"><b>Recomendaciones para la práctica odontológica, según actividades por color de semáforo</b></p>	<b>Tipo de Atención</b>	<b>Atención de Urgencias</b>	<b>Atención de Urgencias.</b>	<b>Atención reducida y con sana distancia.</b>	<b>Atención normal.</b>
	Preventiva	Se establecerá un filtro para realizar una anamnesis específica al paciente que demande el servicio dental: 1.- Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días? 2.- Ha tenido problemas respiratorios incluyendo tos los últimos 14 días? 3.- Ha tenido contacto con alguna persona que haya tenido problemas respiratorios los últimos 14 días?	Promover el Esquema Básico de Prevención intramuros. (Restricción en el uso de pieza de mano)	Promover actividades preventivas intramuros. (limitación en el uso de pieza de mano)	Promover actividades preventivas intra y extramuros.
	Curativa	Si no presenta sintomatología el paciente será atendido, si llegará a presentar sintomatología revisarlo proporcionarle farmacoterapia o alguna solución inmediata y reprogramar su cita.  Se consideran Urgencias: Pulpitis reversible e irreversible, periodontitis apical aguda, celulitis, pericoronitis, trauma dental, absceso periapical agudo, absceso periodontal, sangrado oral, sospecha de patología maligna, fractura de corona o puente que compromete la función masticatoria con dolor e infección, dolor repentino o limitación de la apertura de la boca, luxación de la articulación temporomandibular.	No otorgar atenciones curativas, revisión al paciente, otorgarle solución inmediata y reprogramar cita. (Restricción de la pieza de mano de alta velocidad a menos que la urgencia dental amerite el uso de esta). Limitación del daño causado por caries o fracturas dentales a través del Tratamiento Restaurativo Atraumático (TRA).	Actividades curativas limitadas. (limitación en el uso de pieza de mano y ultrasonido dental) Limitación del daño causado por caries o fracturas dentales a través del Tratamiento Restaurativo Atraumático (TRA).	Actividades curativas sin restricción.
	<b>Indicaciones para el personal vulnerable:</b> Personas con diabetes, Hipertensas, con cáncer, con problema de obesidad, embarazadas, inmunodeprimidas, con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades pulmonares obstructivas) y personas mayores de 60 años	<b>¡Quédate en casa!</b>	Se presenta a laborar en jornada reducida, en días y horario.  Con base en el Acuerdo Publicado en DOF con fecha 15 de Mayo de 2020 y los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral vigente a partir del 18 de Mayo de 2020.	Se presenta a laborar en jornada reducida, en horario.	Se presenta a laborar en jornada normal

**Anexo 1**

**NOTA:** Sin importar el color en el que se encuentre un estado o municipio, se deberán seguir las medidas de salubridad en todo momento, como forma de prevención. Por lo tanto, la Institución o entidad federativa deberá proveer los insumos de protección personal necesarios a los odontólogos operativos, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-2015, Para la Prevención y Control de Enfermedades Bucales, así como los Lineamientos, Protocolos y Recomendaciones, emitidas por las autoridades sanitarias en materia de Prevención, Protección y Sanitización, ya que la Atención Odontológica se considera de ALTO RIESGO por la generación de aerosoles y la distancia entre el odontólogo y paciente.

<b>SEMAFORO</b>	<b>ROJO</b> Atención limitada solo a urgencias (limitar al máximo aerosoles y salpicaduras)  El paciente deberá enjuagarse con peróxido de hidrógeno al 1% o povidona al 0.2% durante 1 minuto para reducir la carga viral.	<b>NARANJA</b> * Acciones curativas limitadas únicamente a atención de Urgencias (limitar al máximo aerosoles y salpicaduras) * Promover el Esquema Básico de Prevención intramuros. (actividad sin aerosol y sin uso de pieza de mano)  El paciente deberá enjuagarse con peróxido de hidrógeno al 1% o povidona al 0.2% durante 1 minuto para reducir la carga viral.	<b>AMARILLO</b> Atención reducida y con sana distancia. * Actividades Curativas Limitadas (limitado uso de la pieza de mano en cuidados urgentes y electivos no urgentes) * Promover actividades intramuros del Esquema Básico de Prevención (limitada generación de aerosoles con pieza de mano de baja velocidad y escariadores)  El paciente deberá enjuagarse con peróxido de hidrógeno al 1% o povidona al 0.2% durante 1 minuto para reducir la carga viral.	<b>VERDE</b> Atención normal * Actividades curativas sin restricción. * Promover actividades preventivas intra y extramuros.  El paciente deberá enjuagarse con peróxido de hidrógeno al 1% o povidona al 0.2% durante 1 minuto para reducir la carga viral.
-----------------	--	---	---	---

<b>Medidas de Salud Pública.</b>  <b>Recomendaciones para la práctica odontológica, según actividades por color de semáforo</b>	<b>TRIAGE</b>	<b>EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA ACTIVIDAD CON AEROSOL Y SALPICADURAS POR URGENCIA</b>	<b>EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA ACTIVIDAD SIN AEROSOL</b>	<b>EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA ACTIVIDAD CON AEROSOL Y SALPICADURAS ÚNICAMENTE POR URGENCIA</b>	<b>EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA ACTIVIDAD SIN AEROSOL</b>	<b>EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA ACTIVIDAD CON AEROSOL</b>	<b>EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA ACTIVIDAD SIN AEROSOL</b>	<b>EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA ACTIVIDAD CON AEROSOL</b>
	<b>A</b> <b>Paciente sin síntomas de COVID 19 y sin características de los grupos B o C</b>	* Gorro * Protección ocular con careta y googles * Cubrebocas quirúrgico (triple capa) con soporte nasal * Bata quirúrgica desechable con puños elásticos e impermeable * Doble guante * Cubre zapato	• Gorro • Protección ocular con careta • Cubrebocas quirúrgico (triple capa) con soporte nasal • Bata de manga larga de algodón • Un par de guantes	* Gorro * Protección ocular con googles y careta * Respirador quirúrgico N95 o equivalente * Bata quirúrgica desechable con puños elásticos e impermeable * Doble guante * Cubre zapato	• Gorro • Protección ocular con careta • Cubrebocas quirúrgico (triple capa) con soporte nasal • Bata de manga larga de algodón • Un par de guantes	• Gorro * Protección ocular con googles y careta • Respirador quirúrgico N95 o equivalente • Bata quirúrgica desechable con puños elásticos e impermeable • Doble guante	* Protección ocular con careta y/o googles * Cubrebocas quirúrgico (triple capa) con soporte nasal * Bata de manga larga de algodón * Un par de guantes	* Gorro * Protección ocular con careta y/o googles * Cubrebocas quirúrgico (triple capa) con soporte nasal * Bata de manga larga de algodón * Un par de guantes
	<b>B</b> <b>Paciente sin síntomas de COVID - 19, pero con contacto estrecho con persona COVID-19</b>	* Gorro * Protección ocular con careta y googles * Respirador quirúrgico N95 o equivalente * Bata quirúrgica desechable con puños elásticos e impermeable * Doble guante * Cubre zapato	NO Reevaluar al paciente transcurridos 14 días desde el último contacto con persona COVID-19	* Gorro * Protección ocular con googles y careta * Respirador quirúrgico N95 o equivalente * Bata quirúrgica desechable con puños elásticos e impermeable * Doble guante * Cubre zapato	NO Reevaluar al paciente transcurridos 14 días desde el último contacto con persona COVID-19	UNICAMENTE URGENCIAS * Gorro * Protección ocular con googles y careta * Respirador quirúrgico N95 o equivalente * Bata quirúrgica desechable con puños elásticos e impermeable * Doble guante * Cubre zapato	NO Reevaluar al paciente transcurridos 14 días desde el último contacto con persona COVID-19	UNICAMENTE URGENCIAS * Gorro * Protección ocular con googles y careta * Respirador quirúrgico N95 o equivalente * Bata quirúrgica desechable con puños elásticos e impermeable * Doble guante * Cubre zapato
	<b>C</b> <b>Paciente COVID-19 diagnosticado o con síntomas de la enfermedad aunque no esté aun con confirmación diagnóstica.</b>	* Gorro * Protección ocular con googles y careta * Respirador quirúrgico N95 o equivalente * Bata quirúrgica desechable con puños elásticos e impermeable * Doble guante * Cubre zapato	NO Diferir los cuidados hasta que el paciente reúna todos los criterios de curación	* Gorro * Protección ocular con googles y careta * Respirador quirúrgico N95 o equivalente * Bata quirúrgica desechable con puños elásticos e impermeable * Doble guante * Cubre zapato	NO Diferir los cuidados hasta que el paciente reúna todos los criterios de curación	UNICAMENTE URGENCIAS * Gorro * Protección ocular con googles y careta * Respirador quirúrgico N95 o equivalente * Bata quirúrgica desechable con puños elásticos e impermeable * Doble guante * Cubre zapato	NO Diferir los cuidados hasta que el paciente reúna todos los criterios de curación	UNICAMENTE URGENCIAS * Gorro * Protección ocular con googles y careta * Respirador quirúrgico N95 o equivalente * Bata quirúrgica desechable con puños elásticos e impermeable * Doble guante * Cubre zapato

<b>Indicaciones para el personal vulnerable</b>	Personal vulnerable ¡Quédate en casa!	Personal vulnerable se presenta a laborar en jornada reducida, en días y horario.	Personal vulnerable se presenta a laborar en jornada reducida, en horario.	Personal vulnerable se presenta a laborar en jornada normal
---	---------------------------------------	---	--	---

**Nota: Ante cualquier duda consultar: Lineamiento técnico de uso y manejo del equipo de protección personal ante la pandemia por COVID-19 y Recomendaciones para el uso del respirador para bioaerosoles (mascarilla N95, kn95 y equivalentes emitidos por la Secretaria de Salud Federal**

**Medidas Preventivas de Desinfección Personal en Ambiente Clínico**

Alcohol en gel con dispensador, Jabon Liquido con Dispensador, Toallas Desechables o Rollos de Papel con soporte

**Desinfección de Superficies**

Hipoclorito de Sodio al 1%, botella con aspersor para soluciones, Desinfectante en spray, toallas desechables o rollos de papel con soporte , toallas desinfectantes o con alcohol. Alcohol al 70%

**Barreras de Protección**

Campos Desechables, Plástico auto-adherente para protección de equipo